



CimoCid



Alkoholische Lösung zur Händedesinfektion

Einsatzbereich

Zur Hygienischen Händedesinfektion in medizinischen Einrichtungen in Schulen, Kindergärten und Heimen und in den Bereichen Lebensmittel, Industrie und öffentlichen Einrichtungen.

Anwendung

Einreiben in die trockenen Hände*. Zur hygienischen Händedesinfektion Hände ausreichend mit CimoCid benetzen und ohne Wasserzugabe 30 Sekunden nach dem Standardverfahren verreiben.

Anwendungsgebiet/Wirksamkeit	Konzentration/Einwirkzeit	Anmerkung
Hygienische Händedesinfektion bakterizid und levurozid	konz. 30 Sek. *	VAH/DGHM, EN 1500
Tuberkulozid (M. terrae)	konz. 30 Sek. *	EN 14348 hohe und niedrige Belastung
begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)	konz. 15 Sek. **	DVV-/RKI-Leitlinie 08/2008
Rotaviren	konz. 30 Sek. *	EN 14476 ohne Belastung
Noroviren (MNV)	konz. 30 Sek. *	EN 14476 niedrige Belastung
* Die Hände während der gesamten Applikationszeit durch das konzentrierte Präparat feucht halten.		
** Für die hygienische Händedesinfektion ist eine Einwirkzeit von mindestens 30 Sekunden einzuhalten.		

Technische Informationen

Karton mit 35 Kittelfl. à 150 ml	Art.-Nr. 00618
Karton mit 10 Eurofl. à 500 ml	Art.-Nr. 00617
Karton mit 10 V10 Fl. à 500 ml	Art.-Nr. 00619
Karton mit 12 Eurofl. à 1.000 ml	Art.-Nr. 00599
Karton mit 6 V10 Fl. à 1.000 ml	Art.-Nr. 00598
Kanister à 5 Liter	Art.-Nr. 20536

Zubehör

Wandspender für 1.000 ml Eurofl.	Art.-Nr. 80054
Handdispenser für 1.000 ml Eurofl.	Art.-Nr. 88019

Wirkstoffe

100 g enthalten 63,1 g Propan-2-ol und 2,9 g Ethanol

Haltbarkeit nach Anbruch 6 Monate.

Kennzeichnung gemäß EG-Verordnung 1272/2008 (CLP): Gefahr; GHS02, GHS07

BAuA Reg.-Nr. N-58085
CHZN4508

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.
Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Produkteigenschaften

- VAH-gelistet
- Wirkt bakterizid, levurozid, tuberkulozid
- begrenzt viruzid (inkl. HIV, HBV, HCV)
- Wirksam gegen Rota- und Noroviren
- Frei von Duft-, Farb- und weiteren Zusatzstoffen
- Aufgeführt in der IHO Viruzidie-Liste

Hinweise

Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Maßnahmen gegen elektrostatische Entladungen treffen. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter lt. lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften der Verwertung zuführen. Sicherheitsdatenblatt beachten.

pH conc

0	2	4	6	8	10	12	14
---	---	---	---	---	----	----	----

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0619

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taunusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE