

bringing technology to life

DATENBLATT

DHD CliniFLO® Low Flow Exerciser Ref. 22-1200



1 - KONTAKTINFORMATIONEN

1-1. Name: Smiths Medical Deutschland GmbH

1-2. Name und Anschrift:

Smiths Medical Deutschland GmbH


Bretonischer Ring 3 85630 Grasbrunn

Tel: +49 (0)89 242959 0 www.smiths-medical.de

2 - PRODUKTINFORMATIONEN		
2-1 – Produktname:	DHD CliniFLO® Low Flow Exerciser	
2-2 – Artikelnummer:	22-2501, 22-4001, 22-2500, 22-2501, 22-2000	
2.3 – MiGeL-Pos.:	/	
2.4 – Produktklassifizierung:	Ila	
■ CE-Kennzeichnung:	CE 0473	
■ Hersteller:	Smiths Medical ASD, Inc.	

2.6 - Produktbeschreibung

DHD CliniFLO dient zur Förderung tiefen Atmens für die postoperative Verhinderung sowie Behandlung einer Atelektase.



2.6 - Katalog-Nr.:

Ref	Beschreibung	Volumen (in mL)	Einheiten
22-1200	CliniFLO® für Frwachsene und Kinder	100-600	12

2.7 - Gerätezusammensetzung und Zubehör: Ohne Latex

- Polystyrol
- Polypropylen
- Polyethylen



bringing technology to life

2.8 - Indikationen:

DHD CliniFLO dient zur Förderung tiefen Atmens für die postoperative Verhinderung sowie Behandlung einer Atelektase

3 - Aufbewahrung und Handhabung

Steril verkauft: Medizinisch sauber

4 - Lagerung und Lagerbedingungen

Gültigkeitsdauer des Produkts:
5 Jahre

5 - Sicherheit der Nutzung

- 5.1 Technische Sicherheit: Inhalt bei beschädigter Verpackung nicht verwenden.
- 5.2 Biologische Sicherheit: /

6 - Gebrauchsanweisung

- 6.1 Gebrauchsanweisung: Auszug aus der Gebrauchsanweisung
 - 1) Den Schlauch mit Mundstück am Gerät befestigen. Schlauch ausziehen.
 - Die W\u00e4hlscheibe auf der R\u00fcckseite des Ger\u00e4tes auf die gew\u00fcnschte Durchflussrate einstellen. Der Patient sollte eine Inhalationsdauer von mindestens 5 Sekunden erreichen k\u00f6nnen.
 - 3) Das Mundstück in den Mund stecken. Langsam und tief einatmen, wobei die runde gelbe Anzeige hinter dem Happy Face zwischen den Pfeilen bleiben muss.
 - 4) So tief wie möglich einatmen. Wenn nicht weiter inhaliert werden kann, den Atem 5 Sekunden lang anhalten, dann normal ausatmen.
 - 5) Dies in der Zeit des Wachzustands bzw. je nach Verordnung pro Stunde 5 bis 10 mal wiederholen.



6.2 - Reinigungsanleitung: /

6.3 - Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch: /

6.4 - Gegenanzeigen:

- 1. Wenn der Patient auch nach ausführlicher Unterweisung das Gerät nicht richtig verwenden kann.
- 2. Wenn die Vitalkapazität weniger als 10 ml pro kg Körpergewicht beträgt.

7 – Zusätzliche Produktinformationen

8 – Liste der Anhänge

PDF-Version der Gebrauchsanweisung

Die Informationen sind korrekt und entsprechen den Spezifikationen des Herstellers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses technischen Datenblattes.